N°. 58.

Observation d'un hydrosarcocelle, accompagné d'une hernie crural du coté gauche :

Le nommé N.N. agé de 74. ans ouvrier en cire habitant un des faubourg de cette ville nommé Entokole. fut transporté le 1.er de mai 1781. à l'hopital de St. Roch dont j'ay la direction. L'ayant examiné, j'ay trouvé qu'il etoit attaqué depuis 8. ans d'un hydrosarcocelle, accompagné d'une hernie crurale du coté gauche, dont la portion des intestins sorti etoit dessendu dans le scrotum, le tout formant une tumeur d'une grosseur monstrueuse, qui des son origine etoit de la grosseur d'une noisette ; et avec le tems augmenta sans la moindre douleur, au point que la longeur prisse depuis (a.) qui est la partie superieure jusqu'a (b.) qui est la partie inferieure, est d'un pied six pouce, quatre ligne. La largeur prisse depuis (c.) jusqu'a (d.) qui est d'une partie laterale à l'autre est d'un pied, neuf pouce, trois ligne. L'epaisseur prisse à la partie inferieure avoit huit pouce, cinq ligne. La circonference quatre pied, quatre pouce, et deux ligne. Le poix passé quatre vingt livre.

Ce malade affoibli par l'age, et la maladie n'a vecuë que quinze jour, à compter du jour de son entré à l'hopital, jusqu'au jour qu'il est mort, et jusqu'au dernier moment de sa vie il ne s'est plein d'aucune espece de douleur, son ventre faisoit regulierement ses fonctions, les urines passoit bien, et sortoit par l'ouverture (e.) formé par l'extremité du prepuce, le reste de la verge etoit compris dans la tumeur sans qu'il soit possible d'en appercevoir la moindre trace ; cet homme pendant sept ans et demy, c'est acquitter des devoirs de son etat, mais comme la maladie faissoit toujours des progrets, il ne fut plus possible au malade de se soutenir sur ses jambes, ny même de se tourner dans son lit, les trois derniers mois de sa vie sa situation ordinaire etoit d'etre couché sur le dos, dans cet attitude toute la partie posterieure de la tumeur qui etoit ulceré

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ARC 15 d.57 n°1

(f.f.f.) dans plusieurs Endroit, portoit sur son matelat, ses cuisses Etoit appuié sur la tumeur qui leurs servoit de coussin, et pour Empecher la pression trop forte, il se soutenoit sur ses talons, et avoit soin de ployer ses genoux.

Des quil fut mort, je le fit transporter à Lamphiteatre de Luniversité, ou jen fit faire louverture En presence des Medecins et Chirurgien de cette ville

On leva dabord la peau qui Etoit plus Epaisse que dans letat ordinaire, sous laquelle paru une soubstance blanchatre, de consistance et de nature du mamellon de vache, Epaisse vers la partie inferieure de la tumeur denviron sept pouce, et moins vers la partie superieure, La section qui se fit en long, et jusque dans linterieure de la tumeur, découvrit une cavité formée par les prolongemens du péritoine dont les parroits Etoit de Lepaisseur de deux ligne.

Cet cavité contenoit aux Environs dix huit livre de fluide brunatre, et sioreux, une portion considerable du canal intestinal, à commencer depuis la moitié du jejunum, tout lilium, le cœcum, Et presque la moitié du colon Etoit desendüe dans la tumeur. Une portion du jejunum et de lilium Etoit contenüe tres Etroitement dans une poche particuliere formé par le peritoine, tous ce paquet intestinal qui baigné dans ce fluide Etoit récouvert de plusieurs couches membraneuses tres noir, sans que le canal intestinal ait souffert la moindre alteration. Les testicules, de meme que la verge, qui Etoit réduit au tiers du volume quils auroit düe avoir se trouvé fixé dans Lexcroissance Epaisse de sept pouces, qui Etoit formé par plusieurs couches membraneuses, et par la dilatation Extraordinaire des differentes cellules que lon rencontroit à chaque incission quon faisoit, et qui approchoit du diamettre, et de la figure de louverture dune cuillier à bouche, ne laisser aucun doute que la maladie nayent son siege dans le tissu celulaire, dont Linfiltration avoit beaucoup

Contribuée à cet dilatation. de même qua Lœdematie des Extremités inferieurs, qui cependant etoit moins forte du coté de la hernie que du coté opposée.

Les vaisseaux spermatiques, les anneaux, et les pilliers anterieures des muscles grand oblique, etoit dans létât ordinaire, de même que les Envelloppes des testicules; Les reste des visceres n'offroit quun changement peu apparent, ocasionné par la deperdition de Substance qui les mettoit dans un Etât dappauvrissement, de même que toutes les parties charnüe de son corps

La vesicule du fiel Etoit du double de son volume ordinaire. L'Epipleon descendoit plus qua L'ordinaire, et surtout du coté de la hernie il alloit presque jusqua Larcade forme par le ligament de poupart; il y avoit aux Environs dune peinte de fluide Epanché dans linterieure de Labdomen, de la même qualité que celui qui Etoit Epanché dans Linterieure de la tumeur. il ná pas Etoit possible pendant le vivant du malade dappercevoir la moindre fluctuation dans labdomen, ny même dans la tumeur, vu son Extreme dureté.

Cet observation que je me fait un plaisir de vous Envoyer Monsieur de même que le tableau representant autant quil â Eté possible de le faire, le malade dans lattitude quil occupoit ordinairement, sera assurement Lobjet de toutes les recherches dont une assemblé aussi Eclairé est susceptible. nayant jusqua present quun seule cas semblable, qui Est le malabou des Indes, dont la description â Eté Envoyé de Pontichéri par le R.P. Mazaret Et qui est cité dans le traité des operations de Dionis.

La difference de la tumeur du malabou, davec celle du malheureux Litthuanien, ~~qui fait le~~ sujet de cet observation Est considerable. Sur la longeur il y â plus que trois pouces

Académie Nationale de Médecine

No. 58. avec un dessin

Six lignes, Sur la Largeur il y a 6. pouce 3. ligne, Sur la Circonference
un pied, quatre pouce, 2. ligne. et Sur le poids 20. livre de plus. Cet
difference du volume, et du poids, jointe à la description des parties Lezé
Ce quon ná pû faire à Legard de Lindien Vû quil vivoit ma Engagé
à Communiquer Cet observation à Lacademie.

il auroit Eté difficile avec cet complication de maladie
de determiner quelle à Eté la primitif, et qui par Consequent à
determinée les autres. mais Comme la maladie à Commencé
imperceptiblement, Et toujours Sans douleurs je presume que
la Stagnation Visqueuse qui cest faite par dilaceration à determinée
le Sarcocelle, auquel cest joingt par la Suite Lhydrocele, cest deux
maladie ayant en même tems occasionné la dilatation, et le
relachement, ont contribuer à la formation de la troisieme; cest ce
qui me fait Croire que la hernie ná Eut lieu quelorsque par
Linfiltration les parties interne ayant perdu leurs ressort, Le ligament
de poupart ayant Eté trop relachés, il ná put opposer aucune
resistance à Lenorme paquet intestinal qui est decendu dans le
Scrotum Sans jamais avoir occasionner la moindre douleur.

Tel à Eté le Sort de Ce pauvre malheureux qui ayant
negligé une maladie tres simple des son origine, et qui nést
accouru aux Secours que Lors quil nettoit plus possible de luy
En procurer. /.

Regnier
Conseillier du Roy de Pologne, Correspondant
de Lacademie Royale de Chirurgie, Professeur
de Chirurgie et daccouchemens, à Luniversité de
Vilna En Litthuanie, /.